

コンピュータ概論のレポート

— 西川先生の課題 —

出題 2010/06/08

学科 数学科

学年 1年

番号 9999

氏名 栗野俊一

1 課題:西川先生の 2005 年の集合論の課題の問題 2.1

1.1 問題

問題 2.1 次の集合について、元を列挙する形に書き直せ。

1. $\{x; x \text{ は実数であり、} x^2 - 2x - 3 = 0 \text{ をみたす}\}$
2. $\{x; x \text{ は実数であり、} x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0 \text{ をみたす}\}$

1.2 回答

1. 与えられた条件 $x^2 - 2x - 3 = 0$ を満す数を、「二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ を解く、公式 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 」を用いて求めると、 $3, -1$ が得られる。これは何れも実数であるので、共に、要求されている条件を満す。また、これ以外には、与えられた条件を満す元は存在しない。

したがって、これを、元を列挙する形にすると、 $\{-1, 3\}$ となる。

(答) $\{-1, 3\}$

2. 与えられた条件 $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ を満す数を求めるために、 $x^3 + 2x^2 - x - 2$ を因数分解すると、次のようになる。

$$\begin{aligned} \text{与式} &= x^3 + 2x^2 - x - 2 \\ &= x(x^2 + 2) - (x + 2) \\ &= x^2(x + 2) - (x + 2) \\ &= (x^2 - 1)(x + 2) \\ &= (x - 1)(x + 1)(x + 2) \end{aligned}$$

よって、この方程式の解は、 $-2, -1, 1$ である。したがって、これを、元を列挙する形にすると、 $\{-2, -1, 1\}$ となる。

(答) $\{-2, -1, 1\}$

2 課題:西川先生の 2005 年の集合論の課題の問題 2.2

2.1 問題

問題 2.2 次の命題を証明せよ。

1. $(A \subset B \text{ かつ } B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$

2. $(A \subset B \text{ かつ } B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$

注意 記号が、西川先生のもので違い、次のような形で定義されているとする。

部分集合 $A \subseteq B$ は部分集合を表す記号とし、 $\forall x[x \in A \Rightarrow x \in B]$ と定義する。この場合は、 $A = B$ の可能性が残る事に注意する。

真部分集合 $A \subset B$ は真部分集合を表す記号とし、 $A \subseteq B$ かつ $A \neq B$ とする。すなわち、 A の要素は全て、 B に含まれるが、 B の中に A の要素でないものがある。

2.2 回答

1. 結論は、 $A \subset B$ すなわち、次の二点を示せばよい。

(a) $\forall x[x \in A \Rightarrow x \in C]$

証明

$x \in A$ とすると $A \subset B$ なので $x \in B$ である。更に、 $B \subseteq C$ なので、 $x \in B$ ならば $x \in C$ なる。すなわち、 $x \in A$ ならば $x \in C$ となるので、表記の命題が成立する。

Q.E.D

(b) $\exists y[y \notin A \text{ かつ } y \in C]$

証明

$A \subset B$ なので B の要素で A に含まれない要素がある。これを x_0 とする。すなわち、 $x_0 \notin A$ かつ $x_0 \in B$ である。一方、 $x_0 \in B$ で、 $B \subseteq C$ なので、 $x_0 \in C$ となる。すなわち、 $x_0 \notin A$ かつ $x_0 \in C$ となるので、表記の命題が成立する。

Q.E.D

2. 結論は、前問と同じである。前半は全く同じなので後半だけを示す。

(a) $\exists y[y \notin A \text{ かつ } y \in C]$

証明

$B \subset C$ なので C の要素で B に含まれない要素がある。これを x_0 とする。すなわち、 $x_0 \notin B$ かつ $x_0 \in C$ である。一方、 $A \subseteq B$ なので、 $x_0 \notin B$ ならば、 $x_0 \notin A$ となる。すなわち、 $x_0 \notin A$ かつ $x_0 \in C$ となるので、表記の命題が成立する。

Q.E.D